

子どもの予防接種 ＊年齢別チェックポイント

★生後2か月を過ぎたら…



生後2か月から
ワクチンデビュー



• 四種混合ワクチンを
始めましょう。
• BCG は5～8か月で

★お誕生日を過ぎ
たら…



1歳、おめでとう。
MR と水痘ワクチン
をプレゼント！

子どもの予防接種スケジュール

任意	定期	出生時	2カ月	3カ月	6カ月	9カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	18歳	19歳	20歳
不活化	B型肝炎																									
生	ロタウイルスワクチン																									
不活化	Hib(インフルエンザ菌b型) ¹⁾																									
不活化	小児用肺炎球菌 ²⁾ (沈降13価)																									
不活化	DPT-IPV I期 ³⁾ DT II期																									
生	BCG																									
生	麻疹または風疹混合(MR)																									
生	水痘																									
生	おたふくかぜ																									
不活化	日本脳炎																									
不活化	インフルエンザ																									
不活化	HPV (ヒトパピローマウイルス)																									

★ 保育園・幼稚園に
なったら…



• 四種混合ワクチンを
忘れていませんか？
• 日本脳炎ワクチンも
ありますよ。

★ 年長さんは…



2回目のMRワクチンは
もう済んだかな？

★小学生では…



二種混合ワクチン、
日本脳炎ワクチンが
ありますよ。

↓接種 通常接種が行なわれている年齢 接種が定められている年齢 接種年齢 やむを得ない事情を有する場合のみ 任意接種種

1) 生後2月から7月未満4週～8週間で3回+追加1回、7月以上12月未満で開始時は初回2回+追加1回、1歳以上で開始した場合は1回。
2) 生後2月から7月未満4週間隔で3回+追加1回、7月以上12月未満で開始時は初回2回+追加1回、12月から24月未満で開始した場合は、2回、24月から60月未満1回。
なお、2013/10月未まで(旧)旧ワクチンで終了した方は、任意で追加接種を行なうこともできます。
3) D:ジフテリア、P:百日咳、T:破傷風、IPV:不活化ポリオを表します。生後3月から9～8週間隔で3回接種、その後12月～18月後1回。
4) 上記以外に、A型肝炎、狂犬病、破傷風、ジフテリアなどに対する任意接種を行なうことができます。